



OC HEALTH CARE AGENCY

(橙县卫生保健局)

新闻稿

即时发布：2024 年 7 月 31 日

联络人：HCA 通讯部

hcacomm@ochca.com
(714) 834-2178

橙县出现麻疹病例

(加州圣安娜市) – 橙县卫生保健局 (HCA) 确认一名国际旅客在拜访橙县 (OC) 期间感染麻疹。该名患者在感染期间曾到访橙县以下地点：

- 7月26日 – Denny's (丹尼斯) 餐厅 (1168 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802) 晚上 7:00 点至 9:00 点
- 7月27日 – CVS 药房 (1803 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802) 下午 12 点 45 分至 2:00 点
- 7月27日 - Walmart (沃尔玛) (1120 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) 下午 1:00 点至 3 点 30 分
- 7月28日 - Anaheim Global Medical Center (阿纳海姆环球医疗中心) 急诊部 (1025 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) 下午 2:00 点至 5:00 点
- 7月28日 - CVS 药房 (1676 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802) 下午 4:00 点至 5 点 30 分

HCA 已经与阿纳海姆环球医疗中心合作，联系可能接触过该病患且面临严重后果风险的人群，包括婴儿、孕妇及免疫系统受损者。曾在上述时间内到过这些地点的人应该：

- 检查自己是否对麻疹免疫。尚未完全接种麻疹疫苗或不确定自己是否免疫的人，应与医疗保健提供者讨论是否需要接种麻疹、腮腺炎及风疹 (MMR) 疫苗。
- 在接触麻疹后 7 天至 21 天内 (症状可能出现的时间段)，监测自己是否出现发烧和/或不明原因的皮疹；如果出现症状，请**留在家中**并立即联系医疗保健提供者寻求指导。

「麻疹传染性极强，可能导致某些个体出现严重疾病。常见症状包括发烧、皮疹、咳嗽和红眼、流泪。」县卫生官员 **Dr. Regina Chinsio-Kwong (雷吉娜·钦秀-郎)** 表示，「麻疹很容易通过空气传播，也很容易通过与感染者的直接接触传播。人们从皮疹出现前大约四天到皮疹出现后四天都具有传染性。任何怀疑自己感染麻疹的人应在前往医疗机构之前先致电医疗提供者，以避免将麻疹病毒传染给他人。接种疫苗是最好的保护措施。」

有关橙县麻疹的信息，包括此病例的任何更新，请访问 www.ochealthinfo.com/measles。

有关麻疹的更多信息，请访问 www.cdc.gov/measles。

关于麻疹疫苗接种：

- 婴儿应在 12 至 15 个月大时接种第一剂 MMR 疫苗。第二剂 MMR 疫苗应在 4 至 6 岁上学前接种。
- 为儿童、青少年和成人接种疫苗是保护年龄太小而无法接种 MMR 疫苗的婴儿的最佳方法。
- MMR 疫苗非常安全，其益处远超过任何风险。副作用通常是轻微的，例如注射部位的酸痛。
- 麻疹在世界许多地方都有发现，包括欧洲、亚洲、非洲和中东。建议尚未接种两剂疫苗的人在国际旅行前接种 MMR 疫苗。

关于橙县卫生保健局

橙县卫生保健局 (HCA) 是一个区域性跨学科卫生机构，并且经认可的卫生部门，负责通过合作和协调公共和私营部门的资源来保护和促进个人、家庭和社区健康。请访问 www.ochealthinfo.com 了解有关服务和资源的更多信息。

###