

## بيان صحفي

مسؤول الاتصال: إدارة المراسلات لوكالة الرعاية الصحية  
hccomm@ochca.com

(714) 834-2178

للنشر الفوري: 31 يوليو 2024

### حالات مرض الحصبة في مقاطعة أورانج

(سانتا آنا - وكالة الرعاية) - أكدت وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج إصابة أحد المسافرين الدوليين البالغين في زيارته إلى مقاطعة أورانج. زار الشخص المذكور المواقع التالية في مقاطعة أورانج أثناء إصابته بالمرض:

- 26 يوليو - مطعم ديني (1168 شارع كاتيل الغربية، أنهايم، كاليفورنيا 92802) من الساعة 7:00 مساءً للساعة 9:00 مساءً.
- 27 يوليو - صيدلية سي في إس (1803 شارع هاربر الجنوبي، أنهايم، كاليفورنيا 92802) من الساعة 12:45 مساءً للساعة 2:00 مساءً.
- 27 يوليو - والمارت (1120 شارع أنهايم الجنوبي، أنهايم، كاليفورنيا 92805) من الساعة 1:00 مساءً للساعة 3:30 مساءً.
- 28 يوليو - قسم الطوارئ في مركز أنهايم الطبي العالمي (1025 شارع أنهايم الجنوبي، أنهايم، كاليفورنيا 92805) من الساعة 2:00 مساءً للساعة 5:00 مساءً.
- 28 يوليو - صيدلية سي في إس (1676 شارع كاتيل الغربية، أنهايم، كاليفورنيا 92802) من الساعة 4:00 مساءً للساعة 5:30 مساءً.

كانت وكالة الرعاية الصحية تعمل مع مركز أنهايم الطبي العالمي على الاتصال مع أي شخص ربما يكون قد تعامل مع هذه الحالة وهو مُعرض لخطر متزايد من العواقب الوخيمة، مثل: الأطفال، والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. على أي أشخاص كانوا متواجدين في المواقع المذكورة أعلاه في هذه الأوقات المذكورة تقريباً:

- مراجعة ما إذا كان لديهم مناعة ضد مرض الحصبة أم لا. يجب على الأشخاص الذين لم يتم تحصينهم بالكامل ضد الحصبة أو الذين لا يعرفون ما إذا كانوا محصنين ضد مرض الحصبة بالفعل أم لا التحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول ما إذا كان يجب عليهم تلقي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).
- مراقبة أنفسهم لمتابعة ظهور أي أعراض للمرض مثل: الحمى و/أو الطفح الجلدي غير المبرر من 7 أيام إلى 21 يوماً بعد تعرضهم للحالة (الفترة الزمنية التي قد تظهر فيها الأعراض)؛ إذا ظهرت الأعراض، يتعين عليهم البقاء في المنزل والاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور لتلقي الإرشادات.

قالت الدكتورة ريجينا تشينسيو-كونج، مسؤولة الصحة بالمقاطعة: "مرض الحصبة مُعدي للغاية ويمكن أن ينتج عنه مرض شديد لدى بعض الأفراد. تشمل الأعراض الشائعة الحمى والطفح الجلدي والسعال واحمرار العينين والدموع". "ينتشر مرض الحصبة بسهولة شديدة عن طريق الهواء وعن طريق الاتصال المباشر بشخص مصاب. يصبح الأشخاص معديين خلال حوالي أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي حتى أربعة أيام بعد ظهوره. يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بمرض الحصبة الاتصال بمقدم الرعاية الطبية قبل الوصول إلى العيادة الطبية، لتجنب تعريض الآخرين لفيروس الحصبة. يمثل التطعيم أفضل حماية".

لمزيد من المعلومات بشأن مرض الحصبة في مقاطعة أورانج بما في ذلك أي مستجدات بشأن هذه الحالة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

[www.ochealthinfo.com/measles](http://www.ochealthinfo.com/measles).

لمزيد من المعلومات بشأن مرض الحصبة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.cdc.gov/measles](http://www.cdc.gov/measles).

بشأن التطعيم ضد مرض الحصبة:

- يجب أن يتلقى الأطفال أول جرعة للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في عمر 12-15 شهراً. يتم إعطاء الجرعة الثانية من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في عمر 4 إلى 6 سنوات قبل الذهاب إلى المدرسة.
- إن تحصين الأطفال والمراهقين والبالغين هو أفضل طريقة لحماية الرضع الذين هم أصغر سناً من أن يتلقوا لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).
- لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) آمنة للغاية وفوائدها تفوق أي مخاطر. الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة، مثل الألم في مكان الحقنة.
- ينتشر مرض الحصبة في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ويوصى بتلقي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) قبل السفر الدولي لأولئك الذين لم يتلقوا جرعتين بالفعل.

#### معلومات عن وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج

وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج هي هيئة صحية إقليمية متعددة التخصصات وبها قسم صحي معتمد، مكلف بحماية وتعزيز صحة الفرد والأسرة والمجتمع من خلال الشراكة والتنسيق بين موارد القطاعين العام والخاص.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.ochealthinfo.com](http://www.ochealthinfo.com) لمعرفة المزيد عن الخدمات والموارد.

###