

اعلامیه مطبوعاتی

برای انتشار فوری: 31 جولای 2024

تماس: ارتباطات HCA

ایمیل: hcacomm@ochca.com

تلفن: (714) 834-2178

مورد ابتلا به سرخک در شهرستان اورنج

(سانتا آنا، کالیفرنیا) - سازمان مراقبت‌های بهداشتی شهرستان اورنج (HCA) یک مورد ابتلا به سرخک را در یک مسافر بین‌المللی بزرگسال که به شهرستان اورنج (OC) سفر کرده بود، تأیید کرده است. این شخص در حین عفونت به مکان‌های زیر در شهرستان اورنج مراجعه کرده است:

- 26 جولای - رستوران دنی (1168 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802) از ساعت 7:00 بعد از ظهر - تا 9:00 بعد از ظهر.
- 27 جولای - داروخانه سی‌وی‌اس (1803 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802) - از ساعت 12:45 بعد از ظهر - ساعت 2:00 بعد از ظهر.
- 27 جولای - والمارت (1120 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) - از ساعت 1:00 بعد از ظهر - 3:30 بعد از ظهر.
- 28 جولای - بخش اورژانس مرکز پزشکی جهانی آناهیم (1025 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) از ساعت 2:00 بعد از ظهر - ساعت 5:00 بعد از ظهر.
- 28 جولای - داروخانه سی‌وی‌اس (1676 W. Katella Ave., Anaheim CA 92802) - از ساعت 4:00 بعد از ظهر - 5:30 بعد از ظهر.

سازمان مراقبت‌های بهداشتی اورنج (HCA) در همکاری با مرکز پزشکی جهانی آناهیم (Anaheim Global Medical Center) بوده، تا با افرادی که ممکن است در معرض این مورد (شخص مبتلا به سرخک) قرار گرفته و در میزان خطر بالا برای عوارض شدید قرار دارند، مانند نوزادان، زنان باردار، و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، تماس بگیرد. افرادی که در مکان‌های بالا در آن زمان بوده‌اند، باید:

- بررسی کنند که آیا آنها در برابر سرخک ایمن هستند یا خیر. افرادی که به طور کامل در برابر سرخک واکسینه نشده‌اند یا نمی‌دانند که آیا از قبل در برابر سرخک مصون هستند یا خیر؛ باید با یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی درباره اینکه آیا باید واکسن (MMR) سرخک، مخمر و ربیلا را دریافت کنند یا خیر، مشورت کنند.
- اگر علائم بیماری با تب و/یا جوش ناشناس از 7 روز تا 21 روز (دوره زمانی که ممکن است علائم ظاهر شود) پس از تماس مشخص شود، افراد باید در منزل بمانند و بلافاصله با یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی تماس بگیرند تا راهنمایی لازم را دریافت کنند.

دکتر رجینا چینسیو-کوونگ، افسر بهداشت شهرستان گفت: "سرخک بسیار مسری است و می‌تواند در برخی افراد به بیماری‌های شدید منجر شود. علائم شایع آن شامل تب، جوش، سرفه، چشم‌های قرمز و آبریزش چشم است. این بیماری به راحتی از طریق هوا و تماس مستقیم با فرد آلوده پخش می‌شود. افراد از حدود چهار روز قبل از بروز جوش تا چهار روز پس از بروز آن مسری هستند. هرکسی که مشکوک به سرخک

است باید قبل از رسیدن به مطب با پزشک خود تماس بگیرد تا دیگران را در معرض ویروس سرخک قرار ندهند. واکسیناسیون بهترین راه حفاظت از آن است.“

برای اطلاعات در مورد سرخک در شهرستان اورنج از جمله هرگونه به روز رسانی در باره این مورد، به www.ochealthinfo.com/measles مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سرخک، به وبسایت www.cdc.gov/measles مراجعه کنید.

در مورد واکسیناسیون سرخک:

- نوزادان باید اولین واکسن MMR خود را در سن 12-15 ماهگی دریافت کنند. دومین دوز واکسن MMR در سن 4 تا 6 سالگی و قبل از ورود به مدرسه تزریق می‌شود.
- واکسیناسیون کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بهترین راه برای حفاظت از نوزادانی است که هنوز به سن دریافت واکسن MMR نرسیده‌اند.
- واکسن‌های MMR بسیار ایمن هستند. مزایای آنها بسیار بیشتر از هرگونه خطراتی است که ممکن است وجود داشته باشد. عوارض جانبی معمولاً خفیف هستند، مانند درد در محل تزریق.
- سرخک در بسیاری از نقاط جهان از جمله اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه وجود دارد. دریافت واکسن MMR قبل از سفرهای بین‌المللی برای کسانی که قبلاً دو دوز دریافت نکرده‌اند توصیه می‌شود.

درباره سازمان مراقبت‌های بهداشتی اورنج

آژانس مراقبت‌های بهداشتی شهرستان اورنج (HCA) یک حوزه بین‌رشته‌ای بهداشتی منطقه‌ای و یک بخش بهداشتی معتبر است که وظیفه حفاظت و ارتقای سلامت فردی، خانواده و جامعه از طریق مشارکت و هماهنگی منابع بخش دولتی و خصوصی را بر عهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات و منابع موجود، به وبسایت www.ochealthinfo.com مراجعه نمایید.

###